

URISIL-LINE®

Полотна из ткани с силиконовым покрытием

URISIL-LINE – это полотно ткани с покрытием из силикона, медицинского класса, Предназначено для лечения уже существующих гипертрофических и келоидных рубцов, и для профилактики их образования при рубцевании ран. Полотна могут использоваться в сочетании с компрессионными изделиями, подшиваться изнутри или составлять отдельные их детали, а также могут быть представлены отдельным изделием (наприм: напальчник, бандаж)

Рекомендации по уходу за изделием и его использованию

Повязки URISIL-LINE (в составе компрессионного изделия или в виде отдельного изделия) необходимо ежедневно тщательно стирать в воде с использованием обычного мыла, без каких-либо добавок, с последующим полосканием в чистой теплой воде. Дать высохнуть и одеть на подготовленную, чистую и сухую область поражения.

- Избегайте использование других моющих средств для стирки изделия, это может вызвать раздражение кожи
- Не просушивать силиконовую поверхность бумажными полотенцами или салфетками, бумага остаётся на поверхности приклеивания
- Внимание! В жаркую погоду или после занятий спортом, т.е. при повышенном потоотделении, необходимо промывать изделия из URISIL-LINE чаще обычного, чтобы обеспечить оптимальный контакт силиконового покрытия с кожей
- В период применения URISIL-LINE не пользуйтесь кремами/мазями в области рубцов

Период восстановительной терапии с использованием URISIL-LINE должен составить не менее 12 часов в день, а по возможности, доведен до 23 часов. Снимать изделие при этом можно только для проведения гигиенических процедур.

Необходимо начинать использование изделий URISIL-LINE постепенно, одевая их в первые 2 дня на 2 часа в день, в последующие 2 дня на 4 часа в день, а затем, каждый день прибавляя по 2 часа, довести до 23 часов в сутки.

Не использовать URISIL-LINE на открытых ранах, ранах с выделениями, и больным с проблемами кожи

В послеоперационный период, использование URISIL возможно только после снятия швов.

Появление сыпи в области рубцов под силиконовым покрытием, может быть вызвано не соблюдением мер гигиены или излишне плотным прилеганием силикона к коже. В случае появления сыпи – прекратить использование изделия и обратиться к курирующему специалисту.